

Virus Papiloma Humano (VPH) y Cáncer de Cuello Uterino



Puntos clave:

- La **citología** ayuda a prevenir el cáncer de cuello de útero al detectar células anormales antes de que se transformen en cáncer; en esa fase pueden ser eliminadas.
- Todas las mujeres entre 25 y 65 años deberían realizarse una citología. Inicialmente, una vez al año, y después de tener dos resultados normales en 2 años consecutivos, las revisiones se podrán realizar cada 3 años, siempre que la paciente adopte una conducta sexual de bajo riesgo.
- Actualmente disponemos de vacunas para reducir el riesgo de cáncer de cuello de útero, pero éstas no eliminan la necesidad de realizar las revisiones ginecológicas.
- En Hospiten contamos con la Unidad de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria, ubicada en Hospiten Rambla. Además del tratamiento integral, nos caracteriza la rapidez en el diagnóstico, con el objetivo de aplicar una terapia individualizada inmediata, médica o quirúrgica, que el paciente podría iniciar en pocos días si así lo requiriese.

Conjuntamente el cribado y la vacunación ofrecerán la mejor protección frente al cáncer de cuello de útero.

Poder prevenir el segundo cáncer más frecuente entre las mujeres de todo el mundo y un elevado número de lesiones precancerosas mediante una vacuna supone un hito histórico sin precedentes.

La OMS y las máximas autoridades sanitarias y científicas nacionales e internacionales han reafirmado repetidamente la seguridad y elevada eficacia de las vacunas VPH haciendo una llamada unánime a favor de la vacunación para conseguir la mayor cobertura entre la población.

HOSPITEN BELLEVUE
C/ Alemania nº 6 Urb. San Fernando
38400 Puerto de la Cruz - TENERIFE
T +34 922 383 551 - T Consultas +34 922 385 235
bellevue@hospiten.es

HOSPITEN TAMARAGUA
C/ Agustín de Bethencourt, 30
38400 Puerto de La Cruz - TENERIFE
T +34 922 380 512 - T Consultas +34 922 385 501
tamaragua@hospiten.com

HOSPITEN SUR
C/ Siete Islas nº 8. Playa de Las Américas
38660 Arona - TENERIFE
T +34 922 750 032 - T Consultas +34 922 777 760
sur@hospiten.com

HOSPITEN RAMBLA
Rambla de Santa Cruz, 115
38001 Santa Cruz de Tenerife - TENERIFE
T +34 922 291 600 - T Consultas +34 922 534 240
rambla@hospiten.com

HOSPITEN LANZAROTE
C/ Lomo Gordo, s/n
35510 Puerto del Carmen
Lanzarote. España
T +34 928 596 100 - T Consultas +34 928 596 181
lanzarote@hospiten.com

HOSPITEN ESTEPONA
Partido de Velerin, c.n. 340, Km. 162
29680 Estepona - MÁLAGA
T +34 952 760 600 - T Consultas +34 952 760 606
estepona@hospiten.com

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS*
Avda. Capitán Ontañón, Edif. Plaza Mayor
(frente al Parque María Cristina)
11202 Algeciras - CÁDIZ
T +34 956 908 935
algeciras@hospiten.com

MD ANDERSON CANCER CENTER MADRID
C/ Arturo Soria, 270
28033 · Madrid · España
T +34 91 277 72 20
info@mdanderson.es
www.mdanderson.es

hospiten

Cáncer de Cuello de útero



Servicio de Ginecología
y Obstetricia

hospiten

www.hospiten.com



* En proceso de certificación

¿Qué es el cáncer de cuello de útero?

Es un cáncer que se desarrolla en el cérvix o cuello del útero, la parte del útero que se abre en la vagina. Sucede cuando células del cérvix se transforman en anormales y empiezan a crecer de manera incontrolada.

El proceso por el que las lesiones precancerosas progresan a cáncer de cérvix puede llevar muchos años.

Afortunadamente, las fases precancerosas tienen un tratamiento exitoso con mínimas secuelas. Sin embargo, no producen ni signos ni síntomas evidentes y pueden ser únicamente encontradas mediante el cribado.

¿Por qué el cribado?

El cribado cervical está diseñado para encontrar células del cuello del útero anormales en fases iniciales, cuando pueden ser fácilmente eliminadas y, por lo tanto, no progresar a cáncer de cérvix. Una vez se ha desarrollado, el tratamiento del cáncer es más difícil y menos exitoso.

El cáncer de cuello de útero está causado por el Virus Papiloma Humano (VPH). El 80% de las mujeres sexualmente activas tendrán una infección por VPH a lo largo de su vida, pero en la mayoría de los casos va a desaparecer espontáneamente sin ningún problema.

En algunas mujeres esta infección se cronifica y tendrán mayor riesgo de desarrollar un cáncer de cuello de útero. Desde la aparición de unas células anormales hasta el desarrollo de un cáncer, transcurren muchos años, pero no hay síntomas claros hasta que el cáncer ha progresado. El cribado es la única manera de encontrar células anormales en las primeras fases, cuando pueden ser fácilmente tratadas con una alta probabilidad de éxito.

¿Qué es una colposcopia?

Es un procedimiento en el que se emplea un microscopio de poco aumento llamado colposcopio para examinar el cuello de útero con mucha precisión. Su práctica no produce molestias adicionales a las que pueda ocasionar la toma de la citología -muy leves- ya que el colposcopio permanece fuera de la vagina.

¿Qué es una biopsia?

Si durante la colposcopia se detecta alguna anomalía, el médico va a extirpar un pequeño trozo (biopsia) del área anormal encontrada.

La biopsia es enviada al laboratorio donde será examinada con microscopio. Cualquier anomalía encontrada en la biopsia será debidamente clasificada para que el médico decida si es necesario o no hacer algún tratamiento.



¿Qué causa el cáncer de cuello uterino?

El cáncer de cuello uterino o cáncer de cérvix está originado por ciertos tipos de Virus Papiloma Humano (VPH). Hay más de 100 tipos de VPH y unos 40 pueden infectar el área genital.

Algunos de estos virus generan la aparición de verrugas genitales, mientras otros originan anomalías en las células del cuello uterino, que pueden de generar en cáncer. La mayoría de las personas que contraen VPH lo eliminan en un periodo de 24 meses. Sin embargo, en algunas pacientes el virus no desaparece, siendo estas mujeres las que tienen un riesgo superior de desarrollar cáncer de cuello uterino.

¿Cómo se contagia el VPH genital?

El VPH genital se contrae generalmente a través del contacto sexual y puede contagiarse de persona a persona por cualquier contacto con la piel, no sólo mediante las relaciones sexuales. Es muy común y la mayoría de los adultos habrán tenido VPH genital en algún momento de su vida, aunque no hayan tenido lesiones.

¿Puede ser tratado el VPH genital?

Hay tratamientos para los tipos de VPH que causan verrugas genitales, pero éstos no han demostrado ser efectivos para los tipos de VPH que pueden originar el cáncer de cuello uterino.

Afortunadamente, la mayor parte de las infecciones de VPH desaparecen por sí solas en 24 meses sin causar mayor problema.